

Vademecum

2025





ÍNDICE

CESACIÓN TABÁQUICA

- Recigarum

CARDIOLOGÍA

- Metsunix
- Sitagliptina Adamed
- Camlad
- Tarlodix Plus
- Tarlodix
- Rabidux
- Roasax
- Vaxar
- Ranozek

SNC

- Oxitril
- Zolafren
- Nemea
- Zonesme
- Qudix
- Qudix prolong
- Acomicil
- Dislaven Retard

ONCOLOGÍA

- Onnimia
- Sybali

Cesación tabáquica



RECIGARUM está indicado en adultos para el **tratamiento de la dependencia tabáquica y reducción de la ansiedad por la dependencia a la nicotina** en fumadores que estén dispuestos a dejar de fumar. ¹

El abandono permanente del hábito de fumar es el objetivo final.

El principio activo es **citisiniclina**, un alcaloide vegetal (que se encuentra, por ejemplo, en las semillas de los árboles del género laburnum), cuya **estructura química es similar a la de la nicotina**.

Provoca un efecto sobre los receptores nicotínicos de acetilcolina. La acción de citisiniclina es similar a la de la nicotina, pero en general es más débil.

La citisiniclina compite con la nicotina por los mismos receptores y gradualmente desplaza la nicotina al tener un enlace más fuerte.

El uso de citisiniclina permite una reducción gradual de la dependencia de la nicotina al aliviar los síntomas de abstinencia.

Posología. Un envase de citisiniclina (100 comprimidos) es suficiente para un ciclo de tratamiento completo. La duración del tratamiento es de 25 días.

Citisiniclina debe tomarse según la siguiente pauta:

Día de tratamiento	Dosis recomendada	Dosis diaria máxima
Del 1º al 3º día	1 comprimido cada 2 horas	6 comprimidos
Del 4º al 12º día	1 comprimido cada 2,5 horas	5 comprimidos
Del 13º al 16º día	1 comprimido cada 3 horas	4 comprimidos
Del 17º al 20º día	1 comprimido cada 5 horas	3 comprimidos
Del 21º al 25º día	1-2 comprimidos al día	Hasta 2 comprimidos

Recigarum

Citisiniclina

Financiado
por el SNS

El paciente debe dejar de fumar a más tardar el 5º día de tratamiento. No se debe seguir fumando durante el tratamiento porque esto podría empeorar las reacciones adversas. En caso de fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse y podrá reanudarse después de 2 o 3 meses.

Para facilitar la posología de RECIGARUM el blíster está calendarizado:



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
RECIGARUM 1,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Citisiniclina	100 comprimidos	7625056	71.16 €

Cardiología



El valor de la innovación

Primera combinación fija de IDPP4 con metformina de liberación modificada ^{2,3}

En pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2.²

METSUNIX está indicado como adyuvante a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en aquellos pacientes que no estén adecuadamente controlados con su dosis máxima tolerada de metformina en monoterapia o aquellos pacientes que ya estén siendo tratados con la combinación de sitagliptina y metformina.²

METSUNIX está indicado como adyuvante a la dieta y el ejercicio en combinación con una sulfonilurea (es decir, terapia de combinación triple) en aquellos pacientes que no estén adecuadamente controlados con la terapia de combinación doble compuesta por su dosis máxima tolerada de metformina y una sulfonilurea.²

METSUNIX está indicado como adyuvante a la dieta y el ejercicio junto con un agonista del receptor gamma activado de proliferador de peroxisoma (PPAR γ) (es decir, una tiazolidindiona), como terapia de combinación triple en aquellos pacientes que no estén adecuadamente controlados con la terapia de combinación doble compuesta por su dosis máxima tolerada de metformina y un agonista PPAR γ .²

METSUNIX también está indicado como terapia adicional a insulina (es decir, terapia de combinación triple), como adyuvante a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en aquellos pacientes en los que una dosis estable de insulina y metformina por sí sola, no proporcione un control glucémico adecuado.²

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad.²

Metsunix

Sitagliptina + metformina

Financiado
por el SNS



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
METSUNIX 50 mg/500 mg comprimidos de liberación modificada	Sitagliptina + metformina	56 comprimidos	7332725	17.50 €
METSUNIX 50 mg/1.000 mg comprimidos de liberación modificada	Sitagliptina + metformina	56 comprimidos	7332701	17.50 €
METSUNIX 100 mg/1.000 mg comprimidos de liberación modificada	Sitagliptina + metformina	28 comprimidos	7332664	17.50 €
METSUNIX 100 mg/1.000 mg comprimidos de liberación modificada	Sitagliptina + metformina	56 comprimidos	7332671	35.00 €

El IDPP4 más ampliamente prescrito ⁴

SITAGLIPTINA ADAMED está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. ⁵

Como monoterapia: ⁵

- en pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y para los que el uso de metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia.

Como terapia oral doble en combinación con: ⁵

- metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento de metformina sola, no proporcionen un control glucémico adecuado.
- una sulfonilurea en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con la dosis máxima tolerada de una sulfonilurea sola, no proporcionen un control glucémico adecuado y cuando la metformina no sea adecuada debido a contraindicaciones o intolerancia.
- un agonista del receptor gamma activado de proliferador de peroxisoma (PPAR γ) (por ejemplo tiazolidindiona), cuando el uso del agonista PPAR γ es adecuado y en aquellos casos en los que la dieta y el ejercicio, junto al tratamiento de un agonista PPAR γ solo, no proporcionen un control glucémico adecuado.

Como terapia oral doble en combinación con: ⁵

- una sulfonilurea y metformina en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con un tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado.
- un agonista PPAR γ y metformina cuando el uso de un agonista PPAR γ es adecuado y en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado.

SITAGLIPTINA ADAMED está además indicada como terapia adicional a la insulina (con o sin metformina) en los casos en los que la dieta y el ejercicio, más una dosis estable de insulina, no proporcionen un control glucémico adecuado. ⁵

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad. ⁵

Sitagliptina Adamed

Sitagliptina

Financiado
por el SNS



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
SITAGLIPTINA ADAMED 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Sitagliptina	28 comprimidos	7283850	4.25 €
SITAGLIPTINA ADAMED 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Sitagliptina	28 comprimidos	7283843	8.50 €
SITAGLIPTINA ADAMED 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Sitagliptina	28 comprimidos	7283874	16.99 €
SITAGLIPTINA ADAMED 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Sitagliptina	56 comprimidos	7549024	33.98 €

Camlad

Candesartán cilexetilo + amlodipino + hidroclorotiazida

Financiado
por el SNS

La primera y única triple combinación fija basada en candesartán⁶

Indicado en la hipertensión esencial como terapia de sustitución en pacientes adultos cuya presión arterial está adecuadamente controlada con la combinación de candesartán cilexetilo, amlodipino e hidroclorotiazida (HCT), administrados simultáneamente al mismo nivel de dosis que la combinación a dosis fija (CDF).⁷

UN TRATAMIENTO MÁS SENCILLO y CON MEJOR ADHERENCIA⁸

La comodidad de una única cápsula al día y la reducción del número de medicamentos mejora la adherencia del paciente en el tratamiento de la HTA.^{9,10}

MEJOR CONTROL DE LA PA⁸

Al combinar tres agentes antihipertensivos con mecanismos de acción complementarios, la triple combinación fija aborda múltiples vías involucradas en la regulación de la PA, mejorando su eficacia general.⁹

Camlad

Candesartán cilexetilo + amlodipino + hidroclorotiazida

Financiado
por el SNS



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
CAMLAD 16 mg / 5 mg / 12,5 mg cápsulas duras	Candescartán + amlodipino + hidroclorotiazida	30 cápsulas	7636434	7.62 €
CAMLAD 16 mg / 10 mg / 12,5 mg cápsulas duras	Candescartán + amlodipino + hidroclorotiazida	30 cápsulas	7636441	8.33 €

Tarlodix Plus

Amlodipino + ramipril + hidroclorotiazida

Financiado
por el SNS

Innovación y avances al servicio del paciente con hipertensión

Única triple combinación en HTA basada en ramipril ^{11, 12}

TARLODIX PLUS está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial como terapia de sustitución en pacientes adultos con presión arterial controlada adecuadamente con amlodipino, ramipril e hidroclorotiazida, tomada en formulaciones de cada uno de los tres componentes por separado o en una formulación de dos componentes más la de un componente sólo. ¹²

Posología. La dosis recomendada es de una cápsula al día. TARLODIX PLUS puede tomarse antes, durante o después de las comidas ya que la ingesta de alimentos no modifica su biodisponibilidad. La combinación a dosis fija no es adecuada para la terapia inicial. Los pacientes en los que se inician simultáneamente ramipril, amlodipino y el diurético, pueden desarrollar hipotensión sintomática. Si es necesario ajustar las dosis, esto sólo debe hacerse sin los monocomponentes. Después de establecer la dosis apropiada, será posible cambiar a dosis fijas. ¹²



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
TARDOLIX PLUS 5 mg/5 mg/12,5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Amlodipino + ramipril + hidroclorotiazida	30 cápsulas	7326946	3.78 €
TARDOLIX PLUS 5 mg/5 mg/25 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Amlodipino + ramipril + hidroclorotiazida	30 cápsulas	7326984	3.78 €
TARDOLIX PLUS 5 mg/10 mg/25 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Amlodipino + ramipril + hidroclorotiazida	30 cápsulas	7326915	7.15 €
TARDOLIX PLUS 10 mg/10 mg/25 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Amlodipino + ramipril + hidroclorotiazida	30 cápsulas	7326960	7.15 €

Tarlodix

Amlodipino + ramipril

Financiado
por el SNS

Innovación y avances al servicio del paciente con hipertensión

Nueva combinación fija de amlodipino con ramipril, único IECA con indicación en prevención de riesgo CV^{13, 14}

TARLODIX está indicado para el tratamiento de la hipertensión en adultos como terapia de sustitución en pacientes con presión arterial controlada adecuadamente con amlodipino y ramipril, utilizados simultáneamente a la misma dosis.¹³

Posología. TARLODIX no debe utilizarse para iniciar el tratamiento de la hipertensión. Las dosis de cada componente deben individualizarse según el perfil del paciente y el control de la presión arterial.¹³

Si se requiere un cambio de dosis, el régimen de dosificación debe determinarse individualmente utilizando primero los componentes individuales de ramipril y amlodipino, y una vez establecido, podría cambiarse a TARLODIX.¹³

La dosis recomendada es de una cápsula al día. La dosis máxima diaria es una cápsula de 10 mg/10 mg.¹³



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
TARDOLIX 5 mg/5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Amlodipino + ramipril	30 cápsulas	7327981	3.78 €
TARDOLIX 5 mg/10 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Amlodipino + ramipril	30 cápsulas	7328032	7.15 €
TARDOLIX 10 mg/5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Amlodipino + ramipril	30 cápsulas	7328056	4.52 €
TARDOLIX 10 mg/10 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Amlodipino + ramipril	30 cápsulas	7327967	7.15 €

Una apuesta por el cumplimiento

Primera combinación fija de IECA y betabloqueante con amplia gama de dosis ^{15, 16}

RABIDUX está indicado como terapia de sustitución para el tratamiento de la hipertensión, hipertensión con síndrome coronario crónico coexistente:

- en pacientes con enfermedad cardiovascular aterotrombótica manifiesta (antecedentes de cardiopatía coronaria o ictus, o enfermedad vascular periférica) o
- diabetes con al menos un factor de riesgo cardiovascular, y/o insuficiencia cardiaca crónica con función sistólica ventricular izquierda reducida (prevención secundaria tras infarto agudo de miocardio: reducción de la mortalidad de la fase aguda del infarto de miocardio en pacientes con signos clínicos de insuficiencia cardiaca cuando se inicia >48 horas después del infarto agudo de miocardio). ¹⁵

Posología. La dosis recomendada es de una cápsula al día. Los pacientes deben estabilizarse con ramipril y bisoprolol utilizados simultáneamente a la misma dosis durante al menos 4 semanas.

La combinación de dosis fija no es adecuada para la terapia inicial. Si se requiere un cambio de dosis, el régimen de dosificación debe determinarse individualmente utilizando primero los componentes individuales. ¹⁵

Rabidux

Ramipril + bisoprolol

Financiado
por el SNS



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
RABIDUX 2,5 mg/1,25 mg cápsulas duras	Ramipril + bisoprolol	30 cápsulas	7423713	3.70 €
RABIDUX 2,5 mg/2,5 mg cápsulas duras	Ramipril + bisoprolol	30 cápsulas	7423720	3.03 €
RABIDUX 5 mg/2,5 mg cápsulas duras	Ramipril + bisoprolol	30 cápsulas	7423737	4.47 €
RABIDUX 5 mg/5 mg cápsulas duras	Ramipril + bisoprolol	30 cápsulas	7423744	4.35 €
RABIDUX 10 mg/5 mg cápsulas duras	Ramipril + bisoprolol	30 cápsulas	7423706	7.34 €
RABIDUX 10 mg/10 mg cápsulas duras	Ramipril + bisoprolol	30 cápsulas	7423645	7.87 €

Roasax

Rosuvastatina + ácido acetilsalicílico

Financiado
por el SNS

Una apuesta por el cumplimiento

La primera doble combinación de
estatina con ácido acetilsalicílico^{17, 18, a}

ROASAX está indicado para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares como terapia de sustitución en pacientes adultos adecuadamente controlados con los monocomponentes administrados concomitantemente a dosis terapéuticas equivalentes.¹⁷

Posología. La dosis recomendada de ROASAX es de una cápsula al día. La combinación de dosis fija no es adecuada para la terapia inicial. Antes de cambiar a ROASAX, los pacientes deben ser controlados con dosis estables de los monocomponentes tomados al mismo tiempo.¹⁷

ROASAX puede administrarse a cualquier hora del día con alimentos. Las cápsulas se deben tragar con abundante líquido y no se deben masticar.¹⁷



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
ROASAX 5 mg/100 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Rosuvastatina + ácido acetilsalicílico	30 cápsulas	7295914	3.48 €
ROASAX 10 mg/100 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Rosuvastatina + ácido acetilsalicílico	30 cápsulas	7295938	6.16 €
ROASAX 20 mg/100 mg cápsulas duras, 30 cápsulas	Rosuvastatina + ácido acetilsalicílico	30 cápsulas	7295921	11.53 €

La importancia de la prevención

Tratamiento de la hipercolesterolemia:

- adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia primaria (tipo IIa incluyendo hipercolesterolemia familiar heterocigótica) o dislipidemia mixta (tipo IIb) como medida complementaria a la dieta cuando la respuesta obtenida con la dieta y otros tratamientos no farmacológicos (p. ej. ejercicio, pérdida de peso) no ha sido adecuada.
- adultos, adolescentes y niños de edad igual o mayor de 6 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica en tratamiento combinado con dieta y otros tratamientos hipolipemiantes (p. ej. aféresis de las LDL) o si dichos tratamientos no son apropiados.

Prevención de eventos cardiovasculares:

- prevención de eventos cardiovasculares mayores en pacientes considerados de alto riesgo de sufrir un primer evento cardiovascular (ver sección 5.1 de la ficha técnica), como tratamiento adyuvante a la corrección de otros factores de riesgo.

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad.¹⁹



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
VAXAR 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Rosuvastatina	28 comprimidos	7313922	3.15 €
VAXAR 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Rosuvastatina	28 comprimidos	7313892	6.30 €
VAXAR 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Rosuvastatina	28 comprimidos	7313908	12.60 €

Cuando la angina persiste,
actúa diferente

Antianginoso con perfil hemodinámico neutro ²⁰

RANOZEK está indicado en adultos como terapia complementaria para el tratamiento sintomático de pacientes con angina de pecho estable que sean intolerantes o que no se controlen adecuadamente con las terapias antianginosas de primera línea (como betabloqueantes y/o antagonistas del calcio). ²¹

Posología. RANOZEK está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 375 mg, 500 mg y 750 mg.

Adultos: la dosis inicial recomendada de ranolazina es de 375 mg dos veces al día. Después de un periodo de tiempo de entre 2 y 4 semanas, se debe aumentar la dosis a 500 mg dos veces al día y, en función de la respuesta del paciente, se podrá volver a aumentar hasta una dosis máxima recomendada de 750 mg dos veces al día. ²¹

Si un paciente experimenta reacciones adversas relacionadas con el tratamiento (p.ej. mareos, náuseas o vómitos), puede ser necesario reducir la dosis de ranolazina hasta 500 mg o 375 mg dos veces al día. Si los síntomas no se resuelven tras la reducción de la dosis, habrá que suspender el tratamiento. ²¹



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
RANOZEK 375 mg	Ranolazina	60 comprimidos	7580492	13.37 €
RANOZEK 500 mg	Ranolazina	60 comprimidos	7580508	17.82 €
RANOZEK 750 mg	Ranolazina	60 comprimidos	7580515	26.73 €

SNC



Oxitril ofrece una gama completa de duloxetina²²

OXITRIL es un antidepresivo IRSN (inhibidores de la recaptación de serotonina/noradrenalina) indicado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, del dolor neuropático periférico diabético y del trastorno de ansiedad generalizada.²²

- Respuesta eficaz a la depresión crónica.²³
- Mayor mejora de los síntomas de la ansiedad.²⁴
- Alivio sintomático del dolor neuropático periférico.²⁵

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad.²²



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
OXITRIL 30 mg comprimidos gastrorresistentes	Duloxetina	7 comprimidos	7196785	2.14 €
OXITRIL 30 mg comprimidos gastrorresistentes	Duloxetina	28 comprimidos	7196792	8.56 €
OXITRIL 60 mg comprimidos gastrorresistentes	Duloxetina	28 comprimidos	7196808	17.12 €
OXITRIL 60 mg comprimidos gastrorresistentes	Duloxetina	56 comprimidos	7196815	34.24 €

La diferencia de eficacia entre antipsicóticos existe

ZOLAFREN es un agente antipsicótico, antimaníaco y estabilizador del ánimo. Indicado para el tratamiento de la esquizofrenia, el tratamiento del episodio maníaco de moderado a grave y la prevención de recaídas en pacientes que presentan trastorno bipolar que hayan respondido al tratamiento con olanzapina durante el episodio maníaco.^{26, 27, 28}

La bioapariencia de ZOLAFREN cápsulas ofrece mayor adherencia al tratamiento con olanzapina (Estudio CAPS).²⁹

La actitud del paciente hacia la medicación, medida mediante el cuestionario DAI del Estudio CAPS, evidencia la existencia de diferencias entre la presentación de olanzapina en cápsulas con la de comprimidos a favor de la primera.²⁹

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad.^{26, 27, 28}



Zolafren

Olanzapina

Financiado
por el SNS



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
ZOLAFREN 2,5 mg cápsulas duras EFG	Olanzapina	28 cápsulas	6845790	8.47 €
ZOLAFREN 5 mg cápsulas duras EFG	Olanzapina	28 cápsulas	6845820	16.94 €
ZOLAFREN 7,5 mg cápsulas duras EFG	Olanzapina	56 cápsulas	6845837	50.82 €
ZOLAFREN 10 mg cápsulas duras EFG	Olanzapina	28 cápsulas	6846094	33.88 €
ZOLAFREN 10 mg cápsulas duras EFG	Olanzapina	56 cápsulas	6846100	67.76 €
ZOLAFREN 15 mg cápsulas duras EFG	Olanzapina	28 cápsulas	6846223	50.82 €
ZOLAFREN 20 mg cápsulas duras EFG	Olanzapina	28 cápsulas	6846278	67.76 €
ZOLAFREN FLAS 5 mg comprimidos bucodispersables EFG	Olanzapina	28 comprimidos bucodispersables	6776599	16.94 €
ZOLAFREN FLAS 10 mg comprimidos bucodispersables EFG	Olanzapina	28 comprimidos bucodispersables	6776506	33.88 €
ZOLAFREN FLAS 10 mg comprimidos bucodispersables EFG	Olanzapina	56 comprimidos bucodispersables	6776513	67.76 €
ZOLAFREN FLAS 15 mg comprimidos bucodispersables EFG	Olanzapina	28 comprimidos bucodispersables	6776537	50.82 €
ZOLAFREN FLAS 20 mg comprimidos bucodispersables EFG	Olanzapina	28 comprimidos bucodispersables	6776551	67.76 €
ZOLAFREN 5 mg comprimidos EFG	Olanzapina	28 comprimidos	6619964	16.94 €
ZOLAFREN 10 mg comprimidos EFG	Olanzapina	28 comprimidos	6619971	33.88 €
ZOLAFREN 10 mg comprimidos EFG	Olanzapina	56 comprimidos	6626580	67.76 €

NEMEA está indicado en esquizofrenia resistente y en trastornos psicóticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson en los casos en los que haya fallado el tratamiento estándar.
30,31, 32

- Pautas posológicas sencillas ayudan a aumentarla adherencia. 33, 34
- Comprimidos ranurados y formato unidosis. 30

Posología. La dosis debe ajustarse individualmente. Para cada paciente debe utilizarse la dosis mínima eficaz. 30, 31, 32



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
NEMEA 25 mg comprimidos EFG	Clozapina	40 comprimidos	6707500	2.27 €
NEMEA 100 mg comprimidos EFG	Clozapina	40 comprimidos	6707531	9.08 €
NEMEA 200 mg comprimidos	Clozapina	40 comprimidos	6898383	18.16 €
NEMEA 25 mg comprimidos bucodispersables EFG	Clozapina	40 comprimidos bucodispersables	7252023	2.27 €
NEMEA 100 mg comprimidos bucodispersables EFG	Clozapina	40 comprimidos bucodispersables	7251996	9.08€
NEMEA 200 mg comprimidos bucodispersables	Clozapina	40 comprimidos bucodispersables	7252016	18.16 €

Zonisamida en 200 miligramos³⁵

ZONESME está indicado como:^{35, 36}

- monoterapia en el tratamiento de las crisis parciales, con o sin generalización secundaria, en adultos con epilepsia recién diagnosticada.
- tratamiento concomitante en el tratamiento de las crisis parciales, con o sin generalización secundaria, en adultos, adolescentes y niños de 6 años y mayores.

La zonisamida es una buena opción de tratamiento como primera línea de combinación.³⁷

Su bajo nivel de interacciones facilita su uso como terapia combinada con otros antiepilépticos.³⁸

Zonisamida es fácil de iniciar, mantener e individualizar en la práctica clínica diaria.³⁸

Su larga vida media permite una toma diaria, mejora el cumplimiento del paciente y puede producir un menor impacto cuando se dejan las tomas.³⁹

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad.^{35, 36}



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
ZONESME 25 mg cápsulas duras EFG	Zonisamida	14 cápsulas	7167266	3.11 €
ZONESME 25 mg cápsulas duras EFG	Zonisamida	28 cápsulas	7167273	6.21 €
ZONESME 50 mg cápsulas duras EFG	Zonisamida	28 cápsulas	7167303	12.42 €
ZONESME 50 mg cápsulas duras EFG	Zonisamida	56 cápsulas	7167310	24.84 €
ZONESME 100 mg cápsulas duras EFG	Zonisamida	56 cápsulas	7167235	49.68 €
ZONESME 200 mg cápsulas duras	Zonisamida	28 cápsulas	7238409	49.68 €

Eficaz en todas las fases del trastorno bipolar ⁴⁰

QUDIX está indicado para: ^{41, 42}

- el tratamiento de la esquizofrenia
- el tratamiento del trastorno bipolar:

para el tratamiento de los episodios maníacos de moderados a graves en el trastorno bipolar.

para el tratamiento de los episodios depresivos mayores en el trastorno bipolar.

- para la prevención de la recurrencia de episodios maníacos o depresivos en pacientes con trastorno bipolar que previamente han respondido al tratamiento con quetiapina.
-

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad. ^{41, 42}



Qudix · Qudix prolong

Quetiapina

Financiado
por el SNS



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
QUDIX 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Quetiapina	60 comprimidos	6645710	5.19 €
QUDIX 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Quetiapina	60 comprimidos	7601371	10.38 €
QUDIX 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Quetiapina	60 comprimidos	6616871	20.76 €
QUDIX 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Quetiapina	60 comprimidos	6616895	41.52 €
QUDIX 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Quetiapina	60 comprimidos	6616918	62.28 €
QUDIX 50 mg comprimidos de liberación prolongada EFG	Quetiapina	60 comprimidos de liberación prolongada	7269144	10.38 €
QUDIX 150 mg comprimidos de liberación prolongada EFG	Quetiapina	60 comprimidos de liberación prolongada	7269090	31.14 €
QUDIX 200 mg comprimidos de liberación prolongada EFG	Quetiapina	60 comprimidos de liberación prolongada	7269106	41.52 €
QUDIX 300 mg comprimidos de liberación prolongada EFG	Quetiapina	60 comprimidos de liberación prolongada	7269113	62.28 €
QUDIX 400 mg comprimidos de liberación prolongada EFG	Quetiapina	60 comprimidos de liberación prolongada	7269120	83.04 €

ACOMICIL está indicado en: ⁴³

- monoterapia en adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años de edad con crisis epilépticas parciales con o sin crisis generalizadas secundarias y crisis tónico-clónicas generalizadas primarias.
- en el tratamiento concomitante en niños de 2 o más años de edad, adolescentes y adultos con crisis epilépticas parciales con o sin generalización secundaria o crisis tónico-clónicas generalizadas primarias.
- en el tratamiento profiláctico de la migraña en adultos después de una cuidadosa evaluación de otras posibles alternativas terapéuticas.
- en el tratamiento de crisis asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut.

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad. ⁴³



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
ACOMICIL 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Topiramato	60 comprimidos	6606315	5.87 €
ACOMICIL 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Topiramato	60 comprimidos	6606322	11.73 €
ACOMICIL 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Topiramato	60 comprimidos	6606339	23.46 €
ACOMICIL 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG	Topiramato	60 comprimidos	6606346	46.92 €

Dislaven Retard

Venlafaxina

Financiado
por el SNS

DISLAVEN RETARD está indicado para: ⁴⁴

- el tratamiento de episodios depresivos mayores.
- para la prevención de recurrencias de episodios depresivos mayores.
- tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada.
- tratamiento del trastorno de ansiedad social.
- tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.

Posología. Existen regímenes de dosificación diferentes para cada indicación. Por tanto, se debe asegurar que los pacientes reciban una información clara sobre la dosificación adecuada para su enfermedad. ⁴⁴



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
DISLAVEN RETARD 75 mg cápsulas de liberación prolongada EFG	Venlafaxina	30 cápsulas de liberación prolongada	6596470	6.14 €
DISLAVEN RETARD 150 mg cápsulas de liberación prolongada EFG	Venlafaxina	30 cápsulas de liberación prolongada	6596463	12.27 €

Oncología




Monoterapia ⁴⁵

Indicado en monoterapia para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico y con receptor de estrógeno positivo:

- no tratadas previamente con terapia endocrina.
- cuya enfermedad ha recidivado durante o después del tratamiento adyuvante antiestrogénico, o bien cuya enfermedad ha progresado a un tratamiento antiestrogénico.

En combinación con palbociclib ⁴⁵

Para el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico receptor hormonal (HR) positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, en mujeres que hayan recibido hormonoterapia previa (ver sección 5.1 de la ficha técnica).



Presentación
de 2 jeringas

En mujeres pre o perimenopáusicas, el tratamiento en combinación con palbociclib debe ir asociado con un agonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH). ⁴⁵

Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
ONNIMIA 250 mg solución inyectable en jeringa precargada EFG	Fulvestrant	2 jeringas precargadas (5 ml cada una) 2 agujas con sistema de seguridad	7279389	342.22 €

Como tratamiento de primera línea del cáncer de mama avanzado hormonodependiente en mujeres postmenopáusicas

Sybali está indicado como tratamiento adyuvante del cáncer de mama temprano invasivo con receptor hormonal positivo en mujeres postmenopáusicas⁴⁶.

Indicaciones terapéuticas de Sybali⁴⁶

- Tratamiento adyuvante del cáncer de mama temprano invasivo con receptor hormonal positivo en mujeres postmenopáusicas.
- Tratamiento adyuvante de continuación del cáncer de mama invasivo hormonodependiente en mujeres postmenopáusicas que hayan recibido con anterioridad una terapia adyuvante estándar con tamoxifeno durante 5 años.
- Tratamiento de primera línea del cáncer de mama avanzado hormonodependiente en mujeres postmenopáusicas.
- Cáncer de mama avanzado en mujeres en estado endocrino postmenopáusico natural o provocado artificialmente, tras recaída o progresión de la enfermedad, que hayan sido tratadas anteriormente con antiestrógenos.
- Tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama HER-2 negativo y receptor hormonal positivo en mujeres postmenopáusicas en las que no es adecuada la quimioterapia y no está indicada la cirugía inmediata.

Sybali

Letrozol



Producto	Molécula	Presentación	Código Nacional	PVL
SYBALI 2,5 mg comprimidos recubiertos EFG	Letrozol	30 comprimidos	7639589	59.00 €

Referencias 1. Ficha técnica Recigarum. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/88780/FT_88780.html (última revisión: enero 2023). **2.** Ficha técnica Metsunix. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/86709/FT_86709.html (último acceso: octubre 2024). **3.** Fichas técnicas combinaciones fijas de iDPP4 con metformina disponibles en <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. (último acceso: octubre 2024). **4.** IQVIA. Datos de iDPP4 España. (último acceso: octubre 2024). **5.** Ficha técnica Sitagliptina Adamed. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/85033/FT_85033.html (último acceso: octubre 2024). **6.** Fichas técnicas dobles y triples combinaciones disponibles en <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. [(búsqueda: Candesarán); (filtro: >1 medicamento con 2 y 3 principios activos en HTA)](último acceso: octubre 2024). **7.** Ficha técnica Camlad. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/89108/FT_89108.html (último acceso: octubre 2024). **8.** B. Williams et al. Rev Esp Cardiol. 2019;72(2):160.e1-e78. **9.** Zaman MA, et al. Cureus. 2023;15(7):e41398. **10.** Mancía G, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens. 2023;41(12):1874-2071. **11.** Fichas técnicas dobles y triples combinaciones disponibles en <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Último acceso: octubre 2024. **12.** Ficha técnica Tarlodix Plus. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/86524/FT_86524.html (último acceso: octubre 2024). **13.** Ficha técnica Tarlodix. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/86556/FT_86556.html **14.** Ficha técnica ramipril. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/65824/FT_65824.html (último acceso: octubre 2024). **15.** Ficha técnica Rabidux. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/87195/FT_87195.html (último acceso: octubre 2024). **16.** Fichas técnicas combinaciones fijas de IECA y betabloqueante. Disponible en: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. (último acceso: octubre 2024). **17.** Ficha técnica Roasax. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/85515/FT_85515.html (último acceso: octubre 2024). **18.** Fichas técnicas combinaciones fijas de rosuvastatina disponibles en: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html> (último acceso: octubre 2024). **19.** Ficha técnica Vaxar. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/86107/FT_86107.html (último acceso: octubre 2024). **20.** Manolis A. et al, Hellenic Journal of Cardiology 71 (2023) 26-32. **21.** Ficha técnica Ranozek. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/87983/FT_87983.html (último acceso: octubre 2024). **22.** Ficha técnica Oxitril. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/82579/FT_82579.html (último acceso: octubre 2024). **23.** Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto. MSSSI.2014. Disponible en: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf. (último acceso: octubre 2024). **24.** Li X, Zhu L, Zhou C, et al. Efficacy and tolerability of short-term duloxetine treatment in adults with generalized anxiety disorder: A meta-analysis. PLoS One. 2018;13(3):e0194501. **25.** Khasbage S, Shukla R, Sharma P, Singh S. A randomized control trial of duloxetine and gabapentin in painful diabetic neuropathy. J Diabetes. 2021;13(7):532-541. **26.** Ficha técnica Zolafren cápsulas. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/74760/FT_74760.html (último acceso: octubre 2024). **27.** Ficha técnica Zolafren comprimidos. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/70351/FT_70351.html (último acceso: octubre 2024). **28.** Ficha técnica Zolafren Flas. Disponible en https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/73569/FT_73569.html (último acceso: octubre 2024). **29.** Arranz, Belen & Garriga, Marina & Buisan, Enric & Bernardo, Miguel. (2015). Impacto de la modificación de la bioapariciencia de los antipsicóticos sobre la adherencia terapéutica en los pacientes con esquizofrenia: Estudio CAPS. Psiquiatría Biológica. **30.** Ficha técnica Nemea 25 y 100 mg comprimidos. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/71566/FT_71566.html (último acceso: octubre 2024). **31.** Ficha técnica Nemea 200 mg comprimidos. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/75901/FT_75901.html (último acceso: octubre 2024). **32.** Ficha técnica Nemea bucodispersables. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/83968/FT_83968.html (último acceso: octubre 2024). **33.** Roca et Al. Adherencia al tratamiento clínico de la esquizofrenia: consenso Español. Actas Esp Psiquiatr 2007;35(Suppl.1):1-6. **34.** Razali MS, Yahya H. Compliance with treatment in schizophrenia: a drug intervention program in a developing country. Acta Psychiatr Scand. 1995;91(5):331-5. **35.** Ficha técnica Zonesme 200 mg. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/83520/FT_83520.html (último acceso: octubre 2024). **36.** Ficha técnica Zonesme 25, 50 y 100 mg. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/82211/FT_82211.html (último acceso: octubre 2024). **37.** Shang Yeong et Al. Zonisamide: Review of Recent Clinical Evidence for Treatment of Epilepsy. CNS Neuroscience & Therapeutics.2015;21:683-691. **38.** Hajo Hamer et Al. Retention, dosing, tolerability and patient reported seizure outcome of Zonisamide as only add-on treatment under real- life conditions in adult patients with partial onset seizures: Results of the observational study ZOOM. Seizure.2016;34:66-73. **39.** Marco Mula. Profile of once-daily zonisamide as monotherapy for treatment of partial seizures in adults. Drug Design, Development and Therapy.2013;7:397-402. **40.** Ather Muneer. Pharmacotherapy of Bipolar Disorder with Quetiapine: A recent Literature Review and an Update. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2015;13(1):25-35. **41.** Ficha técnica Qudix. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/70169/FT_70169.html (último acceso: octubre 2024). **42.** Ficha técnica Qudix Prolong. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84522/FT_84522.html (último acceso: octubre 2024). **43.** Ficha técnica Acomiciil. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/69661/FT_69661.html (último acceso: octubre 2024). **44.** Ficha técnica Dislaven Retard. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/69149/FT_69149.html (último acceso: octubre 2024). **45.** Ficha técnica Onnimia. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/84866/FT_84866.html (último acceso: octubre 2024). **46.** Ficha técnica Sybali. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/89215/FT_89215.html (último acceso: octubre 2024). **a.** Primera en comercializarse.



FICHA TÉCNICA RECIGARUM

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para determinadas condiciones. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Recigarum 1,5 mg comprimidos con película EFG, 100 comprimidos/CN: 762505/PVP IVA: 111,09 €.



FICHA TÉCNICA METSUNIX

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Metsunix 50 mg/500 mg comprimidos de liberación modificada, 56 comprimidos / CN:733272.5/ PVP IVA: 28,10 €. Metsunix 50 mg/1.000 mg comprimidos de liberación modificada, 56 comprimidos /CN:733270.1/ PVP IVA: 33,77 €. Metsunix 100 mg/1.000 mg comprimidos de liberación modificada, 28 comprimidos /CN:733266.4/ PVP IVA: 28,10 €. Metsunix 100 mg/1.000 mg comprimidos de liberación modificada, 56 comprimidos/ CN:733267.1/ PVP IVA: 54,64 €.



FICHA TÉCNICA SITAGLIPTINA

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Sitagliptina Adamed 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos/ CN: 728385/ PVP IVA: 8,40 €. Sitagliptina Adamed 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos/ CN: 728384/PVP IVA: 16,78 €. Sitagliptina Adamed 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos/CN:728387/ PVP IVA: 31,21 €. Sitagliptina Adamed 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 56 comprimidos/ CN:754902/PVP IVA: 62,43 €.



FICHA TÉCNICA TARLODIX

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Tarlodix 5 mg/2,5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 732801.8/PVP IVA: 3,61 €. Tarlodix 5 mg/5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 732798.1/PVP IVA: 5,90 €. Tarlodix 5 mg/10 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 732803.2/ PVP IVA: 11,16€. 10 mg/5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 732805.6/PVP IVA: 7,06 €. Tarlodix 10 mg/10 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/ CN: 732796.7/PVP IVA: 11,16 €.



FICHA TÉCNICA TARLODIX PLUS

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Tarlodix Plus 5 mg/5 mg/12,5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 732694.6/ PVP IVA: 5,90 €. Tarlodix Plus 5 mg/5 mg/25 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 732698.4/PVP IVA: 5,90 €. Tarlodix Plus 5 mg/10 mg/25 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 732691.5/PVP IVA: 11,16 €. Tarlodix Plus 10 mg/10 mg/25 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 732696.0/PVP IVA: 11,16 €.



FICHA TÉCNICA RABIDUX

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Ravidux 2,5 mg/1,25 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 742371/PVP IVA: 3,61 €. Ravidux 2,5 mg/2,5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 742372/PVP IVA: 4,73 €. Ravidux 5 mg/2,5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 742373/PVP IVA: 6,98 €. Ravidux 5 mg/5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 742374/PVP IVA: 6,79 €. Ravidux 10 mg/5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 742370/ PVP IVA: 11,46 €. Ravidux 10 mg/10 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 742364/PVP IVA: 12,29 €.



FICHA TÉCNICA ROASAX

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Roasax® 5 mg/100 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN:729591/PVP IVA: 5,43 €. Roasax® 10 mg/100 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN:729593/PVP IVA: 9,62 €. Roasax® 20 mg/100 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/ CN:729592/PVP IVA: 18,00 €.



FICHA TÉCNICA VAXAR

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Vaxar 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos / CN:731392/PVP IVA: 4,93 €. Vaxar 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos / CN:731389/PVP IVA: 9,85 €. Vaxar 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos /CN:731390/PVP IVA: 19,72 €. Vaxar 40 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 28 comprimidos / CN:731391/No inclusión en el SNS.



FICHA TÉCNICA OXITRIL

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Oxitril 30 mg comprimidos gastrorresistentes, 7 comprimidos gastrorresistentes/ CN: 719678/PVP IVA: 3,34 €. Oxitril 30 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos gastrorresistentes/CN: 719679/PVP IVA: 13,36 €. Oxitril 60 mg comprimidos gastrorresistentes, 28 comprimidos gastrorresistentes/ CN: 719680/PVP IVA: 26,73 €. Oxitril 60 mg comprimidos gastrorresistentes, 56 comprimidos gastrorresistentes/CN: 719681/PVP IVA: 53,45 €.



FICHA TÉCNICA RANOZEK

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Ranozek 375 mg comprimidos de liberación prolongada EFG/ CN: 758049/PVP IVA: 20,87 €. Ranozek 500 mg comprimidos de liberación prolongada EFG/ CN: 758050/PVP IVA: 27,82 €. Ranozek 750 mg comprimidos de liberación prolongada EFG/ CN: 758051/PVP IVA: 41,73 €.



FICHA TÉCNICA ZOLAFREN CÁPSULAS

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Zolaflen 2,5 mg cápsulas duras EFG, 28 cápsulas duras/CN: 684579 /PVP IVA: 13,22 €. Zolaflen 5 mg cápsulas duras EFG, 28 cápsulas duras/CN: 684582 /PVP IVA: 26,44 €. Zolaflen 7,5 mg cápsulas duras EFG, 56 cápsulas duras/CN: 684583 /PVP IVA: 79,33 €. Zolaflen 10 mg cápsulas duras EFG, 28 cápsulas duras/CN: 684609 /PVP IVA: 52,89 €. Zolaflen 10 mg cápsulas duras EFG, 56 cápsulas duras/CN: 684610 /PVP IVA: 105,78 €. Zolaflen 15 mg cápsulas duras EFG, 28 cápsulas duras/CN: 684622 /PVP IVA: 79,33 €. Zolaflen 20 mg cápsulas duras EFG, 28 cápsulas duras/CN: 684627 /PVP IVA: 105,78 €.



FICHA TÉCNICA QUDIX 25, 100, 200 y 300 mg

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Camlad 16 mg/5 mg/12,5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 763643/PVP IVA: 11,90 €. Camlad 16 mg/10 mg/12,5 mg cápsulas duras, 30 cápsulas/CN: 763644/PVP IVA: 13,00 €.



FICHA TÉCNICA ZOLAFREN COMPRIMIDOS

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Zolaflen 5 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos/CN: 661996/PVP IVA: 26,44 €. Zolaflen 10 mg comprimidos EFG, 28 comprimidos/CN: 661997/PVP IVA: 52,89 €. Zolaflen 10 mg comprimidos EFG, 56 comprimidos/ CN: 662658/PVP IVA: 105,78 €.



FICHA TÉCNICA ZOLAFREN FLAS

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Zolafren Flas 5 mg comprimidos bucodispersables EFG, 28 comprimidos/CN: 677659/PVP IVA: 26,44 €. Zolafren Flas 10 mg comprimidos bucodispersables EFG, 28 comprimidos/CN: 677650/PVP IVA: 52,89 €. Zolafren Flas 10 mg comprimidos bucodispersables EFG, 56 comprimidos/CN: 677651/PVP IVA: 105,78 €. Zolafren Flas 15 mg comprimidos bucodispersables EFG, 28 comprimidos/CN: 677653/PVP IVA: 79,33 €. Zolafren Flas 20 mg comprimidos bucodispersables EFG, 28 comprimidos/CN: 677655/PVP IVA: 105,78 €.



FICHA TÉCNICA NEMEA 25 y 100 mg

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Nemea 25 mg comprimidos EFG, 40 comprimidos/CN:670750/PVP IVA: 3,54 €. Nemea 100 mg comprimidos EFG, 40 comprimidos /CN:670753/PVP IVA: 14,17 €.



FICHA TÉCNICA NEMEA 200 mg

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Nemea 200 mg comprimidos, 40 comprimidos/CN:689838/PVP IVA: 28,35 €.



FICHA TÉCNICA NEMEA COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Nemea 25 mg comprimidos bucodispersables EFG, 40 comprimidos/CN: 725202/PVP IVA: 3,54 €. Nemea 100 mg comprimidos bucodispersables EFG, 40 comprimidos/CN: 725199/PVP IVA: 14,17 €. Nemea 200 mg comprimidos bucodispersables, 40 comprimidos/CN: 725201/PVP IVA: 28,35 €.



FICHA TÉCNICA ZONESME 25, 50 y 100 mg

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Zonesme 25 mg, 14 cápsulas EFG/CN: 716726/PVP IVA: 4,85 €. Zonesme 25 mg, 28 cápsulas EFG/CN: 716727/PVP IVA: 9,69 €. Zonesme 50 mg, 28 cápsulas EFG/CN: 716730/PVP IVA: 19,40 €. Zonesme 50 mg, 56 cápsulas EFG/CN: 716731/PVP IVA: 38,78 €. Zonesme 100 mg, 56 cápsulas EFG/CN: 716723/PVP IVA: 77,55 €.



FICHA TÉCNICA ZONESME 200 mg

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Zonesme 200 mg, 28 cápsulas EFG/CN: 723840/PVP IVA: 77,55 €.



FICHA TÉCNICA QUDIX 25, 100, 200 y 300 mg

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Qudix 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos/CN: 664571/PVP IVA: 8,10 €. Qudix 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos/CN: 661687/PVP IVA: 32,41 €. Qudix 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos/CN: 661689/PVP IVA: 64,82 €. Qudix 300 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos/CN: 661691/PVP IVA: 97,22 €.



FICHA TÉCNICA QUDIX 50 mg

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Qudix 50 mg comprimidos recubiertos con película, 60 comprimidos recubiertos con película/CN: 7601371/PVP IVA: 16,20 €.



FICHA TÉCNICA QUDIX PROLONG

11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Qudix Prolong 50 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 60 comprimidos/CN: 726914/PVP IVA: 16,20 €. Qudix Prolong 150 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 60 comprimidos/CN: 726909/PVP IVA: 48,61 €. Qudix Prolong 200 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 60 comprimidos/CN: 726910/PVP IVA: 64,82 €. Qudix Prolong 300 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 60 comprimidos /CN: 726911/PVP IVA: 97,22 €. Qudix Prolong 400 mg comprimidos de liberación prolongada EFG, 60 comprimidos/CN: 726912/PVP IVA: 129,63 €.



FICHA TÉCNICA ACOMICIL
11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Acomicil 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos (frasco)/CN: 660631/PVP IVA: 9,16 €. Acomicil 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos (frasco)/CN: 660632/PVP IVA: 18,31 €. Acomicil 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos (frasco)/CN: 660633/PVP IVA: 36,62 €. Acomicil 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 60 comprimidos (frasco)/CN: 660634/PVP IVA: 73,25 €.



FICHA TÉCNICA DISLAVEN
11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Dislaven Retard 75 mg cápsulas de liberación prolongada EFG, 30 cápsulas/CN: 659646/PVP IVA: 9,59 €. Dislaven Retard 150 mg cápsulas de liberación prolongada EFG, 30 cápsulas/CN: 659647/PVP IVA: 19,15 €.



FICHA TÉCNICA DE ONNIMIA
11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Onnimia 250 mg solución inyectable en jeringa precargada EFG, 1 jeringa precargada de 5 ml + 1 agujas/CN: 727937/PVP IVA: 225,70 €. Onnimia 250 mg solución inyectable en jeringa precargada EFG, 2 jeringas precargadas de 5 ml + 2 agujas/CN: 727938/PVP IVA: 408,86 €.



FICHA TÉCNICA DE SYBALI
11. CONDICIONES DE DISPENSACIÓN Y REEMBOLSO Con receta médica. Incluido en el SNS. **12. PRESENTACIÓN, CÓDIGO NACIONAL Y PRECIO** Sybali 2,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 30 comprimidos/CN: 763958/PVP IVA: 92,10 €.

